

## 新型コロナウイルス感染症予防接種説明書・接種済証

### 新型コロナウイルス感染症とは

新型コロナウイルスに感染することによって起こります。新型コロナウイルス感染症にかかった人が咳やくしゃみなどをすることにより、ウイルスを含む飛沫又はエアロゾルと呼ばれる更に小さな水分を含んだ状態の粒子を吸い込むことによって感染します。(飛沫感染) また、感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスが付きます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。(接触感染) 高熱、咽頭痛・鼻汁・鼻閉・咳といった呼吸器系の症状、倦怠感、筋肉痛、頭痛、味覚症状、下痢等の様々な症状がみられます。高齢者や基礎疾患を患っている方は、重症化しやすいことが明らかになっております。

感染予防のためには、マスクの着用を含めた咳エチケット、手洗い(手指消毒)換気等が効果的です。また、日頃から十分な栄養や休養をとることも大切です。

### 新型コロナワクチンの効果と副反応

新型コロナワクチンについては、有効性及び安全性が確認された上で薬事承認されており、国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。

接種後の副反応としては、注射した部位の痛み・腫れ・発赤・紅斑、注射した同じ腕側のリンパ節(わきの下あたり)の痛み・圧痛・腫れ、発熱、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、悪寒、吐き気等の症状が現れることがあります。

また、重大な副反応として、ショック・アナフィラキシー、(冷や汗が出る、顔面蒼白、動悸、全身のかゆみ、めまい、喉のかゆみ、手足が冷たくなる)や血管迷走神経反射(立ちくらみ、血の気がひく、気を失う(失神する))が現れることがあります。接種後に気になる症状があった場合は、接種医やかかりつけ医までご相談ください。

その他、ワクチン接種後の症状として心筋炎・心膜炎(胸の痛み、動悸、むくみ、息切れ、浅くて速い呼吸)やギラン・バレー症候群(手足に力が入りにくい、しびれ等)が報告されています。これらの症状が現れた場合、速やかに医療機関を受診してください。

### 予防接種健康被害救済制度について

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障がいが残ったり)が起こることがあります。

極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、接種に係る過失の有無に関わらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度が設けられています。詳しくは、市健康増進課までお問合せください。

### 新型コロナウイルス感染症予防接種済証

接種年月日	年 月 日	ワクチンメーカー名
		Lot No.
被接種者住所		実施場所
被接種者氏名		医師名
被接種者生年月日	年 月 日	

## 接種費用助成対象者

小山市に住民登録がある、満65歳以上の方及び満60～64歳までの身体障害者手帳1級（ただし、心臓、腎臓、呼吸器又は免疫の機能障害に限る。）をお持ちの方です。ご本人が希望される場合のみ、接種を行います。

助成対象者は、原則3,500円の自己負担で接種できます。助成は、毎年度1人につき1回までとなります。

## 予防接種を受ける時期と使用するワクチン

助成の対象となる接種は毎年秋から冬にかけての接種となります。また、使用するワクチンは、その時々新型コロナウイルス感染症の流行株に応じて開発されたワクチンを接種することとなります。接種時期や使用するワクチンは、厚生労働省より示されることとなっております。

## 予防接種を受けることができない人

- ① 明らかに発熱のある人（37.5度以上）
- ② 重症な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- ③ 新型コロナワクチンを接種した時や含まれる成分に対し重度の<sup>※</sup>アナフィラキシーを起こしたことがある人  
※アナフィラキシーとは、接種後に全身のかゆみやじんましん、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しさ、血圧低下などのアレルギー反応のことです。
- ④ その他、医師が不適切な状態と判断した場合

## 予防接種を受けるに際し、医師と相談しなくてはならない人

- ① 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- ② 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- ③ 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- ④ 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人やけいれんを起こしたことがある人
- ⑤ ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

## 予防接種を受けた後の一般的注意事項

- ① 予防接種後15分程度（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状や失神等を起こしたことがある方は30分程度）は、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。
- ② 注射した部分は清潔に保つようにし、入浴は差し支えありませんが、接種した部分は強くこすらないようにしましょう。
- ③ 接種当日はいつもどおりの生活をしてかまいませんが、激しい運動や過度の飲酒は控えましょう。

〒323-8686

栃木県小山市中央町1丁目1番1号

小山市役所 健康増進課 保健予防係

電話番号：0285-22-9526